

Primi Esercizi sui Numeri Complessi

Nel seguito, $\mathbb{C} = \{a + ib : a, b \in \mathbb{R}\}$ è l'insieme dei numeri complessi con le operazioni di somma e prodotto definite da:

$$(a+ib)+(a'+ib') = (a+a')+i(b+b'), \quad (a+ib)(a'+ib') = (aa'-bb')+i(ab'+ba'),$$

- (1) Svolgere le operazioni sottoindicate e trovare la parte reale e la parte immaginaria del risultato ottenuto:

$$(1 - 2i) + (\sqrt{2} - i) \quad (1 - 2i) + (\sqrt{2} - i), \quad (1 + 2i) \cdot (1 - 2i), \quad (1 - 2i)^3$$

$$(1 + i)^3, \quad \frac{3 - 2i}{-1 + i}, \quad 3 \left(\frac{1 + i}{1 - i} \right)^2 - 2 \left(\frac{1 - i}{1 + i} \right)^3.$$

- (2) Se $z = a + ib$, il numero complesso $\bar{z} = a - ib$ si dice il *coniugato* di z . Dati due numeri complessi z, z' dimostrare che $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$, $\overline{z \cdot z'} = \bar{z} \cdot \bar{z}'$. Quali sono i numeri complessi tali che $z = \bar{z}$?

- (3) Sia $z = 1/2 + i\sqrt{3}/2$: calcolare la forma trigonometrica di z e di z^3 . Risolvere lo stesso esercizio per i numeri: $1/2 - i\sqrt{3}/2$, $\sqrt{3}/2 + i/2$ e $3/\sqrt{2} - i3/\sqrt{2}$.

- (4) Determinare la parte reale e la parte immaginaria del numero complesso z che ha modulo 2 e argomento $5/6\pi$. Svolgere lo stesso esercizio se il modulo è $\sqrt{2}$ e l'argomento è $5/3\pi$.

- (5) Trovare la parte reale, la parte immaginaria, il modulo e l'argomento principale dei seguenti numeri complessi:

$$z = 3, \quad z = -3, \quad z = i - \sqrt{3}, \quad z = -i\pi/2.$$

- (6) Sia z il numero complesso $1 + i$. Il numero complesso z^3 è:

il doppio di $i - 1$;

$$2\sqrt{2}(\cos(\frac{\pi}{4}) + i\sin(\frac{\pi}{4}));$$

$$2(\cos(\frac{\pi}{2}) + i\sin(\frac{\pi}{2}))$$

V	F
---	---

V	F
---	---

V	F
---	---

- (7) Sia $z = \rho(\cos(\theta) + i\sin(\theta))$ un numero complesso non nullo, scritto in forma trigonometrica.

La forma trigonometrica del coniugato \bar{z} di z è

$$\bar{z} = \rho(\cos(\theta) + i\sin(-\theta));$$

mentre la forma trigonometrica dell'inverso z^{-1} di z è

$$z^{-1} = \rho(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta))$$

V	F
---	---

V	F
---	---

- (8) Trovare un numero complesso z_0 tale che per qualsiasi numero complesso z il numero z_0z sia ottenuto ruotando il vettore z intorno all'origine in senso antiorario di $\pi/4$ radianti.
Svolgere lo stesso esercizio per la rotazione oraria di $\pi/2$ radianti.
- (9) Siano $z = \rho(\cos(\theta) + i\sin(\theta))$ e $z' = \rho'(\cos(\theta') + i\sin(\theta'))$ due numeri complessi in forma trigonometrica. L'argomento di

$$\frac{z^2}{2z'}$$

è:

$$\begin{aligned} 2\theta - \theta'; \\ \frac{\theta^2}{2\theta'}; \\ \theta - \theta' \end{aligned}$$

V	F
V	F
V	F

- (10) Sia $z = 1/2 + i\sqrt{3}/2$. Determinare il numero $z^{39} - z^{36}$.
- (11) Trovare tutte le soluzioni delle seguenti equazioni, verificando la correttezza del risultato.

$$z^4 = -1, \quad z^3 = 1 + i, \quad z^7 = 1, \quad z^5 = -1/2 + i\sqrt{3}/2.$$

- (12) Se z è un numero complesso, indichiamo con $|z|$ il suo modulo. Sia ρ la relazione d'equivalenza definita sui numeri complessi da

$$z\rho z' \Leftrightarrow |z| = |z'|.$$

Determinare la classe del numero i ed un insieme di rappresentanti per le classi d'equivalenza di ρ su \mathbb{C} .

- (13) Sia ρ la relazione d'equivalenza definita sui numeri complessi non nulli da

$$z\rho z' \Leftrightarrow \text{Arg}(z) = \text{Arg}(z')$$

Determinare la classe del numero i ed un insieme di rappresentanti per le classi d'equivalenza di ρ su \mathbb{C} .